


pharmaDigest®

Qu'est-ce que c'est ?

- Vaste base de donnée en ligne pour les pharmaciens et les étudiants sur www.pharmadigest.ch
- Synthèse de publications scientifiques actuelles.
- Informations nouveaux médicaments, pathologies etc.

pharmaDigest® mais encore...

- Evaluation de l'information.
- Documents complémentaires à l'information.



pharmaDigest®

Pourquoi ?

- Gain de temps
- Formation continue: 42 points FPH/an !
- Répondre au mieux aux patients et aux médecins.

pharmaDigest® Homepage

Nouveautés et mises à jour

Nouveau vaccin antigrippal intranasal autorisé en Europe (05.11.2012) **nouveau**

Pression artérielle: fréquence de mesure (01.11.2012) **révisé**

Dénosumab: anticorps monoclonaux contre l'ostéoporose (31.10.2012) **révisé**

Dabigatran en prévention des thromboses (31.10.2012) **nouveau**

→ Rechercher



Abstract pharmaDigest®

L'essentiel en bref

Métamizole: efficacité et effets indésirables

L'efficacité du métamizole est très peu documentée. Rien n'indique une quelconque supériorité de cette molécule par rapport aux AINS. Les effets indésirables sont très rares, mais peuvent parfois mettre en jeu le pronostic vital (agranulocytose, réactions allergiques). Selon l'indication (douleur aiguë post-opératoire, blessure, coliques, douleur cancéreuse), [2] le métamizole ne doit être utilisé qu'en cas d'échec d'autres médicaments, et non comme «analgésique universel». [1]

Pour les détails → le texte complet

pharmaDigest®

Importance de l'information

Importance:

Niveau I

Classement selon l'**importance**

Niveau I → A savoir absolument

Niveau II → A savoir aussi

Niveau III → Pour en savoir plus

pharmaDigest®

Evaluation de l'information

Evaluation:



Très utile en pratique officinale



Apporte quelque chose en pratique



Situations moins fréquentes à l'officine




Mauvais: étude biaisée p.ex



Il existe une controverse sur ce thème

pharmaDigest®

Evaluation du médicament



Deux paramètres

preuve d'efficacité

place dans la thérapeutique

pharmaDigest®

Documents complémentaires

Exemple Fiche Céphalées signes d'alerte

Documents apparentés:

» [Reconnaitre un AVC Test FAST.pdf](#)

Test FAST (Face-Arm-Speech-Time)

Le test FAST vous permet de détecter rapidement si vous avez affaire à une attaque cérébrale. En présence d'un ou plusieurs des symptômes suivants, agissez immédiatement.

FACE



Demandez à la personne de sourire ou de montrer les dents. La bouche est-elle de travers ou la commissure des lèvres pend-elle d'un côté?

ARM



Demandez à la personne de tendre les deux bras devant elle à l'horizontale, de les lever et de tourner les pouces vers le haut. L'un des bras pend-il ou chute-t-il?


pharmaDigest®

Liens cahiers pharmActuel pdf

Exemple Fiche Fièvre au retour de voyage

Fiches pharmActuel apparentées

» [La médecine des voyages](#)



pharmaDigest®

Noms des spécialités suisses

En pointant sur les substances en bas de fiche.

Substances:

Denosumab , Alendronic Acid



Spécialités

- Alendronat Actavis
- Alendronat Spirig®
- Alendron-Mepha®
- Fosavance®
- Alendronat Helvepharm
- Alendronat Streuli®
- Alendronsäure CrossMedika
- Alendronat Sandoz®
- Alendronat-Teva®
- Fosamax®

pharmaDigest®

Formation continue

En 10 questions 4 fois par an.

Démarrer le
questionnaire



1. Laquelle (lesquelles) des affirmations concernant la bilastine est (sont) correcte(s)?

- La bilastine est un antihistaminique H1 indiqué lors de récurrence de polyposse nasale.
- La bilastine doit être prise avec un repas afin de diminuer les effets gastro-intestinaux.
- La bilastine provoque nettement moins de sédation que les autres antihistaminiques H1.
- La bilastine est un antihistaminique H1 qui ne semble pas augmenter l'intervalle QT.