



evidisBasic est intégré dans la caisse (OTC) et dans la saisie des dossiers



Source: pharmaSuisse  
"evidisBasic est un instrument permettant d'accéder rapidement, au point de vente, aux informations et alertes importantes sur les médicaments qui sont délivrés. Ces informations sont destinées à toute l'équipe de pharmacie afin de conseiller au mieux les patients y compris dans les situations de stress."

### Application

Après avoir saisi le médicament, vous recevez un aperçu des informations et alertes disponibles.

OTC User

SubTotal 15.60  
€ 13.00

✓ Prix + taxe  
05.08.2016 236731 1 0 % rabais ligne

Div. 8.00% Div. 2.50% Ptrack 0 D ? ↑ fix h NLPAL 2.50%

Qté	1525443	Prix	%	Montant	TVA	Compte	Date	hh:mm	Phac	Mode de paiement
1	ASPIRIN CARDIO FILMTABL 100 MG 90 STK	15.60	0	15.60	2	h	04.08.2016	11:35	1525443	

En cas d'apparition de troubles gastro-intestinaux: prendre avec les repas  
**Risque d'ulcères gastriques et des hémorragies gastro-intestinales: contre-indiqué en présence de ces troubles**  
Avec l'ibuprofène: réduction potentielle de l'effet cardioprotecteur possible => remplacer par du paracétamol ou d'un autre AINS  
Risque hémorragique accru avec le ginkgo  
Intolérance à l'aspirine: PRUDENCE chez les asthmatiques et les patients souffrant d'urticaire

pour en savoir plus: <cliquez deux fois> sur le sujet désiré

**Risque d'ulcères gastriques et des hémorragies gastro-intestinales: contre-indiqué en présence de ces troubles**

L'acide acétylsalicylique (AAS) est contre-indiqué chez les patients présentant un ulcère gastrique actif ou une anamnèse d'ulcère gastrique, et en cas de pathologies augmentant le risque hémorragique (p. ex. hémophilie) [27].

FACTEUR DE RISQUES: Antécédents d'ulcère, troubles gastriques chroniques ou récidivants (p. ex. brûlures d'estomac, douleurs gastriques, troubles digestifs) [1], âge > 65 ans, sexe féminin, dose élevée d'AAS (≥ 2 g/jour), infection par Helicobacter pylori, tabagisme et consommation importante d'alcool, médicaments [10] (corticostéroïdes, anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] [10,20], anticoagulants, héparine [10], ISRS [20]).

MESURES A PRENDRE : chez les patients à risque [27], l'utilisation préventive des inhibiteurs de la pompe à protons est recommandée [4,27]. Des antagonistes H2 semblent être moins efficaces [29,38] et les analogues de la prostaglandine (misoprostol) sont efficaces, mais moins bien tolérés [38].

Informations supplémentaires Flyers: [deutsch](#) [français](#) [italiano](#) 2 / 5

2 / 5 vous annonce, vous vous trouvez sur le 2ème de 5 sujets disponible.

"**informations supplémentaires**" et "**Flyers**" (infos-patients, trilingues, sous forme de fichiers PDF) sont des liens sur le site de pharmasuisse

Le premier accès demande un Login .

pharmaDigest

evidisBasic

pharmActuel

[Retour](#)[Fiche globale](#)

Création: 30.04.2013

Dernière révision: 30.04.2013

Prochaine révision: 30.04.2015

## Acide acétylsalicylique (anti-agrégant plaquettaire)

Anti-agrégant plaquettaire: Inhibiteur irréversible de la cyclooxygénase (COX)

Orale, solide

**Mécanisme d'action:** Aux doses antithrombotiques, l'effet antiagrégant plaquettaire de l'acide acétylsalicylique (AAS) repose sur l'inhibition de la COX-1. La formation de TXA2, qui active les thrombocytes, est ainsi bloquée.[1,2]

[Rubriques](#)[Commentaire d'expert](#)[Littérature](#)[Produits](#)[► Prise et conseils d'utilisation](#)[▼ Contre-indications](#)

- ⓘ Risque d'ulcères gastriques et des hémorragies gastro-intestinales: contre-indiqué en présence de ces troubles:** L'acide acétylsalicylique (AAS) est contre-indiqué chez les patients présentant un ulcère gastrique actif ou une anamnèse d'ulcère gastrique, et en cas de pathologies augmentant le risque hémorragique (p. ex. hémophilie) [27]. **FACTEUR DE RISQUES:** Antécédents d'ulcère, troubles gastriques chroniques ou récidivants (p. ex. brûlures d'estomac, douleurs gastriques, troubles digestifs) f11, âge > 65

### Avertissements:

- » En cas d'apparition de troubles gastro-intestinaux: prendre avec les repas
- » Risque d'ulcères gastriques et des hémorragies gastro-intestinales: contre-indiqué en présence de ces troubles
- » Avec l'ibuprofène: réduction potentielle de l'effet cardioprotecteur possible => remplacer par du paracétamol ou d'un autre AINS
- » Risque hémorragique accru avec le ginkgo
- » Intolérance à l'aspirine: PRUDENCE chez les asthmatiques et les patients souffrant d'urticaire